

Opgroeien van jonge hoenders en krielen

De zomerperiode is angebroken. Alle kuikens zouden nu al meerdere weken oud moeten zijn; met andere woorden sluiten we nu het broedseizoen nu definitief af.

Meerdere leden zullen ook dit jaar te kampen hebben gehad met allerlei ziekten en ongemakken. Ondanks de blijkbaar goede zorgen, die iedere fokker zich voorneemt, duiken er dan toch nog altijd onvoorziene problemen op.

Laten we beginnen met het prille begin!

De kuikens komen (in groten getale) uit het ei en verhuizen vanuit de broedkast naar hun eerste verblijf. De eerste weken zal alles gunstig verlopen, want er is voldoende eten en drinken voorzien in de doorgaans vrij kleine en beperkte ruimte. Na twee weken worden de dieren mondiger en er wordt stilaan met eten en vooral met water gemorst. Hier mogen we dus al beginnen op te treden, zodat de diertjes een propere en droge ruimte behouden.

Tussen de vier en zes weken, is het namelijk evident en wederkerig, dat de kuikens de kampen hebben met bepaalde vormen van coccidiose. Hierbij moet er zo snel mogelijk ingegrepen worden.

Vanaf de zesde tot de tiende week kan er ook nog een worminfectie optreden. Hierbij kan een jaarlijkse wormkuur (die zowel bij de jonge als bij de oude dieren wordt toegepast) de schade zo goed als quasi nihil beperken.

Een kwaal, waar we de laatste jaren haast geen vat op hebben, is de conditie van het vederkleed; vooral in de staartpartij en vleugels, daarbij meestal goed zichtbaar op een donker veerveld. Een degeneratie treedt namelijk op waarbij deze de schijn vertoont, als dat er uitgerafelde naden op het uiteinde van de veer zitten. Een tekort aan dierlijke eiwitten, is hiervan de oorzaak. Dit tekort treedt de laatste jaren op in het pluimveevoeder, doordat er geen dierlijke eiwitten meer in deze voeding mogen verwerkt worden. Dieren die buiten vrij kunnen rondscharrelen, hebben dit probleem haast niet, omdat ze de kans krijgen hun dagelijkse portie dierlijke eiwitten te vergaren. Uit ervaring weet ik, dat bij het regelmatig benevelen van het verenkleed met 'white spirit' de schade goed kan beperkt blijven. Ook het wek maken van kattenbrokken (aanwezigheid van vismeel en dierlijk afval) doet dit euvel tot een strikt minimum herleiden.....